

1999

MATHEMATICS

Paper 1

*[Maximum Marks : 300]**Time : 3 Hours]*

INSTRUCTIONS

Each question is printed both in English and in Kannada.

Answers must be written in the medium specified (English or Kannada) in the Admission Ticket issued to you, which must be stated clearly on the cover of the answer book in the space provided for this purpose. No credit will be given for the answers written in a medium other than that specified in the Admission Ticket.

*Answer any five questions.**All questions carry equal marks.*

ಫರೀಡ್ ಮಹಿನೆ : ಈ ಪೋಲ್ಯೂಡ್ ಸೊಬನೆಗಳ ಕಷ್ಟದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಈ ಕ್ಷತ್ರೇ ಪತ್ತಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ವೃಷಿದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

[Turn over

12/1

(2)

1. (a) Find the coordinates of the vectors

$$V_1 = (1, 2, 1) \text{ and } V_2 = (1, 0, -1)$$

relative to the basis $Z_1 = (1, 1, 0)$, $Z_2 = (1, 0, 1)$, $Z_3 = (1, 1, 1)$.

- (b) Let T be the linear operator on C^3 for which

$$T(1, 0, 0) = (1, 0, i); \quad T(0, 1, 0) = (0, 1, 1); \quad T(0, 0, 1) = (i, 1, 0).$$

Show that T is not invertible.

- (c) Given $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, use the fact that A satisfies its

characteristic equation to compute A^2 and also since A is non-singular, compute A^{-2} .

2. (a) Define Rank of a Matrix and find the rank of

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

- (b) For the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, find non-singular matrices

P and Q such that PAQ is in the normal form.

- (c) Show that the characteristic values of a diagonal matrix are precisely the elements in the diagonal. Hence, show that if a matrix B is similar to a diagonal matrix D , then the diagonal elements of D are the characteristic values of B .

(3)

12/1

1. (ಎ) $Z_1 = (1, 1, 0)$, $Z_2 = (1, 0, 1)$, $Z_3 = (1, 1, 1)$ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು, $V_1 = (1, 2, 1)$ ಮತ್ತು $V_2 = (1, 0, -1)$ ಸದಿಶಗಳ ಸ್ಥಾಪನಿದೇಶಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

- (ಬಿ) T ಎಂಬುದು C^3 ಮೇಲೆ ರೇಖೀಯ ನಿರ್ವಾಹಕ (linear operator) ಆಗಿರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ $T(1, 0, 0) = (1, 0, i)$; $T(0, 1, 0) = (0, 1, 1)$; $T(0, 0, 1) = (i, 1, 0)$. T ವಿಶೇಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

$$(ಒ) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, A^2 ನ್ನು ಗಣನೆಮಾಡಲು A ತನ್ನ ವಿಲಕ್ಷಣ

ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ವಾಲೀಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಸಿ, ಹಾಗೂ A ಅನ್ವಯಿತವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ A^{-2} ನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡಿ.

2. (ಎ) ಕ್ರಮಚೌಕದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನದರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(ಬಿ) \text{ ಕ್ರಮಚೌಕ } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ ಗೆ } PAQ \text{ ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗಿ } P \text{ ಮತ್ತು } Q \text{ ಕ್ರಮಚೌಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.$$

ಅನ್ವಯಿತವಲ್ಲದ P ಮತ್ತು Q ಕ್ರಮಚೌಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

- (ಗಿ) ಒಂದು ಕಣಕರೇಖಾ ಕ್ರಮಚೌಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಣಕರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಾಂಶಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಅಧ್ಯರಿಂದ, ಕ್ರಮಚೌಕ B ಯು ಕಣಕರೇಖಾ ಕ್ರಮಚೌಕ D - ಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ D ಯು ಕಣಕರೇಖಾ ಮೂಲಾಂಶಗಳು B ಯ ಪೀಠಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

/Turn over

12/1

(4)

3. (a) If A is an orthogonal matrix, show that A' and A^{-1} are also orthogonal.

- (b) Determine the characteristic roots and the associated characteristic vectors for the matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

- (c) Reduce the quadratic form $3x^2 + 5y^2 + 3z^2 - 2yz + 2zx - 2xy$ to the canonical form. Also, specify the matrix of transformation.

4. (a) Find the slope for the given parametric equations of a curve $x = 2t$ and $y = \frac{16}{t}$ at the point $t = 4$.

- (b) Trace the curve $y = \frac{1}{6}x^3 - x^2$.

- (c) Show that the diameter of the right circular cylinder of greatest curved surface which can be inscribed in a given cone is equal to the radius of the cone.

5. (a) Find the volume cut from the paraboloid $x^2 + 4y^2 = 2$, by the plane $z = 1$.

- (b) Find the value of $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$.

- (c) Evaluate $\int_0^{\pi/2} \sin^{5/3} \theta \cos^{4/3} \theta d\theta$.

(5)

12/1

3. (ಎ) A ಒಂದು ಸಮಕೋನೀಯ ಕ್ರಮಚೌಕವಾಗಿದ್ದರೆ, A' ಮತ್ತು A^{-1} ಇವೂ ಸಹ ಸಮಕೋನೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

(ಬಿ) ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಚೌಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸದಿಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

(ಒ) $3x^2 + 5y^2 + 3z^2 - 2yz + 2zx - 2xy$ ಈ ವರ್ಗಣಮೂನೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ (canonical form) ಇಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕ್ರಮಚೌಕವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ.

4. (ಎ) $t = 4$ ಬೀಂದುವಿನಲ್ಲಿ, $x = 2t$ ಮತ್ತು $y = \frac{16}{t}$ ಎಂದು ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ನಿಯತಾಂಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಪತ್ತಿ (slope) ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(ಬಿ) $y = \frac{1}{6}x^3 - x^2$ ಇದರ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(ಒ) ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಂಕುವಿನಲ್ಲಿ ಒಳರೇಖಿಸಬಹುದಾದ, ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಗು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಲಂಬ ವರ್ತುಲ ಸೀಲಿಂಡರಿನ ವ್ಯಾಸವು, ಶಂಕುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

5. (ಎ) $z = 1$ ಪಾಠಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞೇದಿಸಲಾದ $x^2 + 4y^2 = 2$ ಹೃಷಿಕೆಲಾದಿಂದ ಕ್ರತ್ವರ್ಹಿಸಿದ್ದರ ಘನ ಆಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(ಬಿ) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$$(ಒ) \int_0^{\pi/2} \sin^{5/3} \theta \cos^{4/3} \theta \, d\theta \quad \text{ಇದರ ಮೌಲ್ಯವಾಗನ ಮಾಡಿ.}$$

/ Turn over

12/1

(6)

6. (a) Find the equation of the circle inscribed in the triangle determined by the lines $2x - 3y + 21 = 0$, $3x - 2y - 6 = 0$ and $2x + 3y + 9 = 0$.

- (b) Show that the pair of straight lines joining the origin to the points of intersection of the line $y = mx + c$ and the circle $x^2 + y^2 = a^2$ are at right angles, if $2c^2 = a^2(1 + m^2)$.

- (c) If e and e' are eccentricities of a hyperbola and its conjugate, show that $\frac{1}{e^2} + \frac{1}{e'^2} = 1$.

7. (a) Find the equation to the sphere which passes through the points $(1, -3, 4)$, $(1, -5, 2)$, $(1, -3, 0)$ and whose centre lies on the plane $x + y + z = 0$.

- (b) Find the condition for the spheres

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 \text{ and}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2u'x + 2v'y + 2w'z + d' = 0$$

to cut each other orthogonally.

- (c) Find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes $3x + y - 5z + 7 = 0$ and $x - 2y + 4z - 3 = 0$ and through the point $(3, 2, -4)$.

8. (a) Solve :

$$x \frac{dy}{dx} + y = x^3 y^6.$$

- (b) Solve :

$$(1 + xy)y dx + (1 - xy)x dy = 0.$$

- (c) The number N of bacteria in a culture grew at a rate proportional to N . The value of N was initially 100 and increased to 332 in one hour. What would be the value of N after $1\frac{1}{2}$ hours ?

9. (a) Solve :

$$(1 + x)^2 \frac{d^2y}{dx^2} + (1 + x) \frac{dy}{dx} + y = 2 \sin(\log(1 + x)).$$

- (b) Solve :

$$y'' + 4y' + 4y = \sin t, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0.$$

- (c) Solve :

$$(2x + 3)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - (2x + 3) \frac{dy}{dx} - 12y = 6x.$$

6. (ಎ) $2x - 3y + 2l = 0, 3x - 2y - 6 = 0$ ಮತ್ತು $2x + 3y + 9 = 0$ ರೇಖೆಗಳಿಂದ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಳರೇಖಿತವಾದ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- (ಬಿ) $2e^2 = a^2(1 + m^2)$ ಅಗಿದ್ದರೆ, $y = mx + c$ ರೇಖೆಯನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸುವ ಹಾಗೂ
 $x^2 + y^2 = a^2$ ವೃತ್ತವನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ
ಕಾರಣದಿಂದ ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
- (ಬಿಂದಿ) e ಮತ್ತು e' ಗಳು ಒಂದು ವೃತ್ತಪರಾಖೋಲಾ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನುವತ್ತಿದ ಉತ್ತೇಂದ್ರಿಯತ್ವ
ಗೊಳಿಸುತ್ತಿರೆ, $\frac{1}{e^2} + \frac{1}{e'^2} = 1$ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
7. (ಎ) $(1, -3, 4), (1, -5, 2), (1, -3, 0)$ ಹಾಗೂ $x + y + z = 0$ ಸಮತಲದ ಮೇಲಿನ
ಕೇಂದ್ರ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯುವ ಗೋಳದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- (ಬಿ) $x^2 + y^2 + z^2 + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0$ ಮತ್ತು
 $x^2 + y^2 + z^2 + 2u'x + 2v'y + 2w'z + d' = 0$ ಈ ಗೋಳಗಳು ಪರಸ್ಪರ
ಸಮಕೋನೀಯವಾಗಿ ಕತ್ತಲಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಉತ್ತಾಧಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- (ಬಿಂದಿ) $3x + y - 5z + 7 = 0$ ಹಾಗೂ $x - 2y + 4z - 3 = 0$ ಸಮತಲಗಳನ್ನು
ವಿಚ್ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ $(3, 2, -4)$ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯುವ
ಸಮತಲದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
8. (ಎ) $x \frac{dy}{dx} + y = x^3 y^6$ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- (ಬಿ) $(1 + xy) y dx + (1 - xy) x dy = 0$ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- (ಬಿಂದಿ) ಒಂದು ಸಂವಧನವಾದಲ್ಲಿರುವ (culture) N ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾಗಳು N ಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ
ದರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. N ಮೌಲ್ಯವು ಅರಂಭದಲ್ಲಿ 100 ಇದ್ದಿತು; ಒಂದು ಗಂಟೆಯ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 332 ಕ್ಕೆ ದಿರಿತು. $1\frac{1}{2}$ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ N ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
9. (ಎ) ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ :

$$(1 + x)^2 \frac{d^2y}{dx^2} + (1 + x) \frac{dy}{dx} + y = 2 \sin(\log(1 + x)).$$

(ಬಿ) ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ :

$$y'' + 4y' + 4y = \sin t, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0.$$

(ಬಿಂದಿ) ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ : $(2x + 3)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - (2x + 3) \frac{dy}{dx} - 12y = 6x.$

[Turn over

12/1

(8)

10. (a) Show that the volume of the tetrahedron ABCD is $\frac{1}{6} [\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]$. Hence, find the volume of the tetrahedron formed by the points (1, 1, 1), (2, 1, 3), (3, 2, 2) and (3, 3, 4).

- (b) Verify Divergence Theorem for

$$\vec{F} = (x^2 - yz)\vec{i} + (y^2 - zx)\vec{j} + (z^2 - xy)\vec{k}$$

taken over the rectangular parallelopiped $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c$.

(c) Prove that $\begin{Bmatrix} i \\ ij \end{Bmatrix} = \frac{\partial}{\partial x^i} (\log \sqrt{g})$.

11. (a) A rod AB of length a has its centre of gravity at G where $\frac{AG}{BG} = \frac{m}{n} (> 1)$. The rod hangs from a smooth peg C by a light string of length l which is attached to the ends of the rod and passes over the peg. Show that if $l > \left(\frac{m+n}{m-n}\right)a$, there is a position of equilibrium which is not vertical.

- (b) A body of weight W is placed on a rough plane whose inclination to the horizontal is α . If $\alpha > \lambda$ where λ is the angle of friction, find the least force which will prevent the body from sliding down the plane.

- (c) The position of a particle moving in a straight line is given by $x = a \cos nt + b \sin nt$. Prove that it executes simple harmonic motion of period $\frac{2\pi}{n}$ and amplitude $\sqrt{a^2 + b^2}$.

12. (a) A particle is hanging from a fixed point by a light cord 3 feet long and is started with an initial horizontal speed such that the cord slackens when the particle is 5 feet above the lowest point. Find upto how much height it will rise.

(9)

12/1

10. (ಎ) ABCD ಚತುರ್ಭುಂಬಿಯ ಫನಗಾತ್ರವು $\frac{1}{6} [\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]$ ಅಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಅಡ್ಡರಿಂದ (1, 1, 1), (2, 1, 3), (3, 2, 2) ಹಾಗೆ (3, 3, 4) ಬೆಂದುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚತುರ್ಭುಂಬಿಯ ಫನಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

- (ಬಿ) ಅಯಾಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಪ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಪ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಪ್ರಯೋಜನಿಕ್ 0 ≤ x ≤ a, 0 ≤ y ≤ b, 0 ≤ z ≤ c ಯಾ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ $\vec{F} = (x^2 - yz) \vec{i} + (y^2 - zx) \vec{j} + (z^2 - xy) \vec{k}$ ಗೆ ಅಷಾರಣ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

$$(ಒ) \begin{bmatrix} i \\ j \\ ij \end{bmatrix} = \frac{\partial}{\partial x^i} (\log \sqrt{g}) \quad \text{ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ.}$$

11. (ಎ) AB ಏಂಬ ಸರಳಿನ ಉದ್ದ್ವಾಗಿ G ಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರಾತ್ಮಕೆಂದ್ರವನ್ನು ಹೇಣಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ $\frac{AG}{BG} = \frac{m}{n} (> 1)$ ಅಗಿದೆ. ಈ ಸರಳಿ C ಏಂಬ ಸಪಾಟಾದ ಗೂಟದಿಂದ / ಉದ್ದ್ವಾಗಿ ಒಂದು ಹಗುರ ದಾರದಿಂದ ತೂಗಣಕಲ್ಪಿತದೆ. ಈ ದಾರವನ್ನು ಇರಳಿಸ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ದ್ವಾಗಿ ಗೂಟದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಬಹುತ್ತದೆ. $l > \left(\frac{m+n}{m-n} \right) a$ ಅಗಿದ್ದರೆ, ನೇರವಾಗಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಮತೋಲನ ಹಿಡಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

- (ಬಿ) W ಒಂಬ ತೊಕವಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಒರಟು ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದೆ. ಸಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಈ ಸಮತಲದ ಓಲುವಿಕೆಯು a ಅಗಿದೆ. $a > l$, ಅಗಿದ್ದು ಈ ಎಂಬುದು ಘಟನೆಯ ಕೋನವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಸ್ತುವು ಸಮತಲದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಬಲವೇಯ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

- (ಒ) ಒಂದು ಸರ್ಪಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಣವೋಂದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು

$x = a \cos nt + b \sin nt$ ಎಂದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು $\frac{2\pi}{n}$ ರಷ್ಟು ಸರಳ ಸಾಮರಷ್ಯ ಚಲನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ $\sqrt{a^2 + b^2}$ ರಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕೆಜಾವನ್ನು (Amplitude) ಘೃತವಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ.

12. (ಎ) ಒಂದು ವಸ್ತುವು 3 ಅಡಿ ಉದ್ದ್ವಾಗಿ ಹಗುರವಾದ ಹುರಿಯಿಂದ ಒಂದು ನೀತ್ತಿಕ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ತೂಗುಬಿದ್ದಿದೆ. ವಸ್ತುವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಬಿಂದುವಿನಿಂದ 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹುರಿಯು ಸಾಧಿಲಗೊಳ್ಳುವೆಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಮಾಂತರ ವೇಗದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎತ್ತು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

/Turn over

12/1

(10)

- (b) A hemispherical bowl is filled with water and immersed and placed with its plane base in contact with a horizontal table. Show that the resultant vertical thrust on its surface is one-third of the thrust on the table.
- (c) Let W_1 and W_2 be the weights of a body in vacuum and water respectively. Prove that the weight of the body in air of specific gravity s will be $W_1 - s(W_1 - W_2)$.

(11)

12/1

- (ಬಿ) ನೀರು ತುಂಬೆ ಅಥವಾ ಹಾಕ್ಯತಿಯ ಬೋಗುಣಿಯನ್ನು ಅದರ ಸಮೃತಲ ತಳವು ಸಮಾಂತರ ಮೇಜೆನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಲಂಬ ನೊಕು ಒತ್ತಡಪ್ತ (thrust) ಮೇಚಿನ ಮೇಲೆನ ನೊಕು ಒತ್ತಡದ $\frac{1}{3}$ ರಷ್ಟೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೇಗೆದಿರಿಸಿ.
- (ಒ) ಶೂನ್ಯ ಕಾರ್ಬನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕವು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ W_1 ಮತ್ತು W_2 ಎಂದಿರಲಿ. ಈ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವಾರ್ಥವ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕವು $W_1 - s(W_1 - W_2)$ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ.

1999

MATHEMATICS**Paper 2***Time : 3 Hours]**[Maximum Marks : 300***INSTRUCTIONS***Each question is printed both in English and in Kannada.*

Answers must be written in the medium specified (English or Kannada) in the Admission Ticket issued to you, which must be stated clearly on the cover of the answer book in the space provided for this purpose. No credit will be given for the answers written in a medium other than that specified in the Admission Ticket.

Answer any five questions choosing at least two from each Section.

All questions carry equal marks.

ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ : ಈ ಪ್ರೀಲ್ಯಂಡ್ ಕೋಚನೆಗಳ ಕಣ್ಣದ ರೊಪಾಂತರವನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ತಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Turn over

12/2

(2)

SECTION A

1. (a) Prove that a finite semi-group satisfying cancellation laws is a group.
 (b) Find an isomorphism between a finite group G and a permutation group.
 (c) Show that a normal sub-group N of G is maximal if and only if the quotient group G/N is simple.
2. (a) Prove that the characteristic of a finite field is prime.
 (b) Show that for any two ideals A and B of a ring R , $A \cup B$ is an ideal of R if and only if either $A \subseteq B$ or $B \subseteq A$.
 (c) Show that in a Unique Factorisation Domain (UFD) every irreducible element is prime.
3. (a) Examine the continuity of the function

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ A, & x = 0, \quad A \in R \end{cases}$$

- (b) Prove that in a Euclidean space R , every Cauchy sequence is convergent.
- (c) Find the area of the positive quadrant bounded by the circle $x^2 + y^2 = 16$ and the straight line $y = x$.

4. (a) Define the improper integral $\int_a^\infty f(x) dx$, $a > 0$ where f is a

bounded function on the interval concerned. Show that $\int_0^\infty \frac{1}{x^2} dx$
is convergent.

(3)

12/2

ಭಾಗ A

1. (a) ಕ್ಷಾನ್‌ಲೇಂಜನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅರೆಸಮಾಹವು ಒಂದು ಸಮಾಹ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ.
 - (b) ಒಂದು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಸಮಾಹ G ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕ್ರಮಯೋಜನೆ ಗುಂಟಿನ ನಡುವೆಯ ಒಂದು ಸಮಾನಾಕೃತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - (c) ಭಾಗಲಭ್ರ ಗುಂಪು G/N ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ G ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಸಮಾಹ N ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
2. (a) ಅವಿಭಾಜ್ಯತೆಯು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ.
 - (b) ಒಂದು ವರ್ತುಲ R ನ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅದರ್ಶಗಳಾದ A ಮತ್ತು B ಗೆ, $A \subseteq B$ ಅಥವಾ $B \subseteq A$ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ $A \cup B$ ಯು R ನ ಅದರ್ಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
 - (c) ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಪವರ್ತನೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ (UFD) ತಗ್ಗಿಸಲಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
3. (a) ಕೆಳಕಂಡ ಉತ್ತರದ ಅವಿಜ್ಞಾನತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ :

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ A, & x = 0, \quad A \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- (b) ಒಂದು ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಅವಕಾಶ R ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಟಿ ಸರಣಿಯೂ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ.
- (c) $x^2 + y^2 = 18$ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಾಗೂ $y = x$ ಸರಳರೇಖೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಾದ್ರಂಟೋನ ವಿಶ್ಲೇಷಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. (a) ಅಸಮರ್ಪಕ ಅನುಕಲ $\int_a^{\infty} f(x) dx, a > 0$ ವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ f ಎನ್ನುವುದು

ಒಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಅವಕಾಶದ ಬಂಧಿತ ಉತ್ತರ. $\int_0^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

(Turn over)

12/2

(4)

- (b) If $f \in R[a, b]$ and if $m \leq f \leq M$, then prove that

$$(i) m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$$

$$(ii) |f| \in R[a, b]$$

- (c) If (a, b) is a point of the domain of definition of a function $f(x, y)$ such that (i) $f_x(a, b)$ exists, and (ii) $f_y(x, y)$ is continuous at (a, b) , then, prove that $f(x, y)$ is differentiable at (a, b) .

5. (a) If $u = \sin x \cosh y + 2 \cos x \sinh y + x^2 - y^2 + 4xy$, then prove that u satisfies the Laplace equation, and determine the corresponding analytic function $u + iv$.

- (b) What is a Taylor series ? State the regions in which the Taylor expansion of the following functions are valid :

$$(i) \log(1 - z)$$

$$(ii) \frac{z^2 - 1}{(z+2)(z+3)}$$

- (c) If $f(z)$ is an analytic function, prove that

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |f(z)|^2 = 4 |f'(z)|^2$$

6. (a) Classify the points $z = 0, 1$ and ∞ in relation to the function

$$f(z) = \left(\frac{z-2}{z^2} \right) \sin \left(\frac{1}{1-z} \right)$$

- (b) Define residue. If a function $f(z)$ is analytic in the extended plane except at a finite number of singularities including $z = \infty$, then show that the sum of the residues of $f(z)$ is zero.

(5)

12/2

(ಒ) $f \in R[a, b]$ ಹಾಗೂ $m \leq f \leq M$, ಅಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ :

$$(i) m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$$

$$(ii) |f| \in R[a, b]$$

(ಃ) (a, b,) ಎನ್ನುವುದು $f(x, y)$ ಎಂಬ ಉತ್ಪನ್ನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಲಯ ಬೀಂದುವಾಗಿದ್ದು (i) $f_x(a, b)$ ಇರುವಂತಿದ್ದರೆ (ii) $f_y(x, y)$ ಇದು (a, b) ಯಲ್ಲಿ ಅವಿಚ್ಛಿಸುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ $f(x, y)$ ಇದು (a, b) ಯಲ್ಲಿ ಅವಕಳನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ.

5. (ಎ) $u = \sin x \cosh y + 2 \cos x \sinh y + x^2 - y^2 + 4xy$ ಅಗಿದ್ದಾಗ, u ಲಾಪ್ಲೇಸ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ವಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಖಾರಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ಪನ್ನ $u + iv$ ಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿ.

(ಒ) ಟ್ರೈಲರ್ ಸರಣಿ ಎಂದರೆನು ? ಯಾವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಟ್ರೈಲರ್ ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಿಂಧುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ :

$$(i) \log(1-z)$$

$$(ii) \frac{z^2-1}{(z+2)(z+3)}$$

(ಃ) $f(z)$ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ,

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |f(z)|^2 = 4 |f'(z)|^2$$

ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ.

6. (ಎ) $f(z) = \left(\frac{z-2}{z^2} \right) \sin \left(\frac{1}{1-z} \right)$ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ $z=0, 1$ ಮತ್ತು ∞ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಘರೀಜಿಸಿ.

(ಒ) ಶೇಷ ಎಂದರೆನು ? ವಿವರಿಸಿ. ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ $f(z)$ ಎಂಬುದು $z = \infty$ ಹೇಗೆ ದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿತೆಗಳ ಪರಿಷಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ಸಮುದಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕವಾಗಿದ್ದಾಗ $f(z)$ ನ ಶೇಷಗಳು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

/ Turn over

12.2

(6)

c) Prove that $\int_0^{\infty} e^{-x^2 \cos^2 \alpha} \cos(x^2 \sin 2\alpha) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cos \alpha$

7. (a) Obtain the partial differential equation of all spheres of radius c having their centres on the xy -plane.
- (b) Solve the equation
 $(y + z)p - (z + x)q = x - y$
- (c) Find the complete integral of $pq + xp + yq = 0$, using Charpit's method.
8. (a) Define a complete integral of a partial differential equation. Show that $z = 1$ is the singular integral of $z^2(1 + p^2 + q^2) = 1$.
- (b) Solve : $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \cos x \cos 2y$
- (c) Solve :
(i) $p^2 + q^2 = 1$
(ii) $pz = 1 + q^2$

(7)

12/2

$$(2) \int_0^{\infty} e^{-x^2 \cos^2 \alpha} \cos(x^2 \sin 2\alpha) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cos \alpha \quad \text{ಎಂಬುದನ್ನು ಕರುತ್ತಿರಿ.}$$

7. (a) xy ಕರುತಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಜ್ಯೋ ಹೇಳಿರುವ ಏಷ್ಟು ಗೋಖರ್ಣಾ ಅಂತಿಕ ಅವಕಲನೀಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಿಸಿಯಿರಿ.

(b) ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಉತ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣಿಸಿಯಿರಿ :

$$(y + z)p - (z + x)q = x - y$$

(c) ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಚ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ $pq + xp + yq = 0$ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಕಲಪನ್ನು (integral) ಸಂಪೂರ್ಣಿಸಿಯಿರಿ.

8. (a) ಅಂತಿಕ ಅವಕಲನೀಯ ಅನುಕಲನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಕಲಪನ್ನು ವಿವರಿ.

$$z^2(1 + p^2 + q^2) = 1 \quad \text{ಇಂಥಿಗೆ} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{z} \quad \text{ಅನುಕಲಪನ್ನು} \quad z = 1 \quad \text{ಆಗಿತ್ತುದ್ದೇ ಎಂಬುದನ್ನು} \quad \text{ಶ್ರೀಜ್ಯೋ ವಿವರಿ.}$$

(b) ಉತ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣಿಸಿಯಿರಿ :

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \cos x \cos 2y.$$

(i) $p^2 + q^2 = 1$

$$(ii) \quad pz = 1 + q^2$$


Turn over

12/2

(8)

SECTION B

9. (a) A block of mass m_2 can slide on another block of mass m_1 , which in turn slides on a horizontal surface as shown in the figure. Using x_1 and x_2 as coordinates, obtain Lagrange's equations of motion.



- (b) A circular cylinder of radius 3 cm and weight W whose centre of gravity, G , is at a distance 1 cm from the axis, rolls on a horizontal plane. If motion be just started from the position of unstable equilibrium, show that the normal reaction of the plane when G is in its lowest position is $\frac{W(2+K^2)}{(1+K^2)}$, where $2K$ is the radius of gyration about an axis passing through G .
- (c) (i) Give an example for a system with 3 degrees of freedom.
(ii) Give an example for a system with 2 generalised coordinates.

10. (a) Derive Lagrange's equations of motion for a non-holonomic system in the form

$$\frac{d}{dt} \left\{ \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right\} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^m \lambda_j a_{ji}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$


with usual notations.

(9)

12/2

ವಿಭಾಗ B

9. (a) ಮೂಲಕ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಗ್ರಹಿಯಾದು m_1 ದ್ವಾರಾ ಉತ್ಪಾದಿತ ಬಂಧನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿ. ನಾನ್ಯಾ ಈ m_1 ಅಂತರ್ಗ್ರಹಿಯು ಸಹ ಬೆಳ್ತುದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತರ್ಗ್ರಹಿ ಮೇಲೆ ಜಾರುತ್ತದೆ. x_1 ಮತ್ತು x_2 ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕಾರಕಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಾಂಗ್ರಂಡ್‌ನ ಚಲನೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



- (b) 3 ಸೆಂಮೀ ಕ್ರಿಷ್ಟಾ ಹಾಗೂ ತೋಕ W ಮತ್ತು G ಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕಾರಕವಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಾಕಾರದ ಉರುಳೆಯು ಅಕ್ಕದಿಂದ 1 ಸೆಂಮೀ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಮಾಂತರ ಪರಿಷಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಧಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಅಂತ್ಯೇ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅರಂಭಿಸಿದರೆ G ಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಕ್ಕನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಗಿ ಸಮಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು $\frac{W(2+K^2)}{(1+K^2)}$ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ $2K$ ಎಂಬುದು G ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆನ ಗ್ರೇವಿಟಾ ಕ್ರಿಷ್ಟಾಗಾಗಿ.

- (c) (i) 3 ಕಿಗ್ರಿಗಳ ಮುಕ್ತ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರವಸ್ಥೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.
- (ii) 2 ಸಾಧಾರಣೆಕೃತ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ದೇಶಕಗಳಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರವಸ್ಥೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

$$10. (\omega) \frac{d}{dt} \left\{ \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right\} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^m i_j a_{ji}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

ರೂಪದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಪ್ರವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಜ್ಞಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಗ್ರಂಡ್ ನ ಚಲನೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

12/2

(10)

- (b) Three equal uniform rods AB, BC and CD are smoothly joined at B and C, and the ends A and D are fastened to smooth fixed points whose distance apart is equal to the length of the rod. The frame at rest is in the form of a square. A blow J is given perpendicular to AB at its middle point and in the plane of the square. Show that the energy set up is $\frac{3J^2}{40m}$, where m is the mass of each rod.
- Find also the blows at the joints B and C.
11. (a) Discuss Bernoulli's equation in Hydrodynamics.
- (b) Discuss the potential function corresponding to the stream function $\Phi = Ar^{\alpha} \sin\left(\frac{\pi\theta}{\alpha}\right)$ satisfying the Laplace equation. Sketch the flow nets for $\alpha = \frac{\pi}{2}$.
12. (a) Derive the general form of the equation of motion of an inviscid fluid.
- (b) Prove that the stream lines are straight if the speed is the same everywhere.
13. (a) What is the convergence criteria for Newton-Raphson's method ? Find an iteration formula for the reciprocal of a given number N and hence express $\frac{1}{3}$ in decimal notation without using division.
- (b) Find the root of $x^4 - x - 10 = 0$ between 1 and 2 by both bisection and secant methods. Which one converges faster ? Why ?
- (c) Using modified Euler's method, find an approximate value of y when $x = 0.3$, given that $\frac{dy}{dx} = x + y$ and $y = 1$ when $x = 0$.
14. (a) Find the interpolating polynomial for the following data :

x :	-2	0	3	4	5	10
y :	4	0	9	16	5	100

(11)

12/2

- (ಬಿ) ಸಮಾದ ಏಕರೂಪದ AB, BC ಮತ್ತು CD ಎಂಬ ಮೂರು ಸರಳಗಳನ್ನು B ಮತ್ತು C ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಯವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು A ಹಾಗೂ D ತುದಿಗಳನ್ನು ಸಪಾಟಾದ ನಿಷ್ಠಿತ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಸರಳನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಪಾನವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಚಚೋಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. AB ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಅದರ ಮುಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಚೋಕದ ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ J ಎಂಬ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು (Blow) ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬ್ರೈಡನ್‌ಪ್ರೈಪ್ $\frac{3J^2}{40m}$ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ m ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಳನ ದ್ರವ್ಯಾತೀಯವಾಗಿದೆ. B ಮತ್ತು C ಜಾಯಿಂಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

11. (ಎ) ಹೃದ್ಯೋದ್ಯಮವೊಂದಲ್ಲಿ ಬೆನೋಂಲಿಯ ಸಮೀಕರಣ ಕುರಿತು ಜರ್ಜೆಂಟ್.

- (ಬಿ) ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಕ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹಾಲಿಸುವ $\Phi = Ar^{\alpha} \sin\left(\frac{\pi\theta}{\alpha}\right)$ ಎಂಬ ಸ್ಥಿರಾಂಶು ಉತ್ತರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದಿಯಾದ ಅಂತರ್ಭ್ರಾತ್ರ ಉತ್ತರಣವನ್ನು (potential function) ಕುರಿತು ಜರ್ಜೆಂಟ್. $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ಗೆ ಚೇತ್ತು: ನೆಟ್‌ಗಳ ಜಿತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ.

12. (ಎ) ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಫಿಕ್ ದ್ರವದ ಚಲನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

- (ಬಿ) ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹರಿವು ರೇಖೆಗಳು (stream lines) ಸರಕೆಂಬೆಲ್ಲಾರ್ಥವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿ.

13. (ಎ) ಸ್ವೀಟ್‌ನ್‌ರ್ಯಾಫ್‌ನ್ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏಕಕೆಂದ್ರೀಕರಿತೆಯ ಅಳತೆಗೊಳು ಯಾವುದು? ಕೆಳಕ್ಕಿರುವ ಸಾಷ್ಟ್ಯ N ನ ಪ್ರತಿಲೋಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುನರ್‌ಪ್ರತಿಪಾದನ ಫೋರ್ಮುಲಾ (Iteration formula) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಗಾಂಶ ಮಾಡದೆ $\frac{1}{3}$ ಯನ್ನು ದರಖಾಂತ ಸಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

- (ಬಿ) 1 ಮತ್ತು 2 ರ ನಡುವೆ $x^4 - x - 10 = 0$ ಗೆ ಸಮಭಾಜಕ ಮತ್ತು ಸಿಕಂಡ್ ರೇಷನ್‌ವಿಧಾನಗಳೆರಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಕೆಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ?

- (ಬಿ) ಪರಿಪೂರ್ಣಿಸಿದ ಯೂಲರ್‌ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ y ಗೆ ಸರಿಸುವಾರು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ $x = 0.3$ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; $x = 0$ ಅಗಿದ್ದಾಗ $\frac{dy}{dx} = x + y$ ಮತ್ತು $y = 1$ ಅಗಿರುತ್ತದೆ.

14. (ಎ) ಕೆಂಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಹುಪದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ :

x :	-2	0	3	4	5	10
y :	4	0	9	16	5	100

(Turn over

12/2

(12)

- (b) Apply Runge-Kutta fourth order method, to find an approximate value of $y(0.2)$ and $y(0.4)$ from $10 \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$, $y(0) = 1$, taking $h = 0.1$.
- (c) What is the advantage of using Stirling's central difference formula over Gauss forward or backward central difference formulae during interpolation ? Interpolate the value of y at $x = -1$ from the following

x :	1	3	5	-2	2
y :	1	8	24	3.5	4

by any of the forward and backward interpolation formulae.

15. (a) (i) Show that if $P(A) = P(B) = P(C) = 1$, then $P(A \cap B \cap C) = 1$.
(ii) If the joint density function of two random variables X and Y is

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2(x+2y)}{3}, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

find the conditional mean of X given $Y = \frac{1}{2}$.

- (b) Show that χ^2 distribution tends to normal distribution for large degrees of freedom.

16. (a) Solve the following LPP by both graphical and simplex methods. Compare the results.

Maximize $z = 2x_1 + 3x_2$,

subjected to the conditions

$$x_1 + 2x_2 \leq 10$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

(13)

12/2

- (ಬಿ) $h = 0.1$ ಎಂದು ಪರಿಗಳಿಕೆಯಂಡು $10 \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$, $y(0) = 1$ ಎಂಬುದರಿಂದ
 $y(0.2)$ ಮತ್ತು $y(0.4)$ ಎಂಬುದರ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ರಂಗ್-ಕುಟ್ಟಾ ನಾಲ್ಕುನೇ ಅಯಾಮದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ.
- (ಿ) ಪ್ರಕ್ರೀಷನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನ ಮುನ್ದುದೆ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿತ ಸ್ಥಿರಂಗ್-ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ ಅನುಕಳಿತ
ಬಿನ್ಮ ? ಕೆಳಕಂಡದ್ದರಿಂದ $x = -1$ ನಲ್ಲಿ y ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ದುದೆ ಅಥವಾ
ಹಿನ್ನಡೆ ಪ್ರಕ್ರೀಷನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರೀಷನ ಮಾಡಿ :

x :	1	3	5	-2	2
y :	1	8	24	3.5	4

15. (ಬಿ) (i) $P(A) = P(B) = P(C) = 1$ ಅಗಿದ್ದಾಗ $P(A \cap B \cap C) = 1$ ಅಗಿರುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

(ii) X ಮತ್ತು Y ಎಂಬ ವರದು ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚರಗಳ ಕಾಡು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಉತ್ತರವು

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2(x+2y)}{3}, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{ಅಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ} \end{cases}$$

$Y = \frac{1}{2}$ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, X ನ ಉಪಾಧಿಕ ಮಾರ್ಪಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

- (ಬಿ) ಅಧಿಕ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ χ^2 ವಿಶರಣೆಯ ಸಾಧಾರಣ ವಿಶರಣೆಯತ್ತ ಪ್ರಮ್ಮತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

16. (ಬಿ) ಕೆಳಕಂಡ LPP ಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ನಿಂಬ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಧಾನಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಘಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ. ಕೆಳಕಂಡ ಉಪಾಧಿಗಳಿಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಿ $z = 2x_1 + 3x_2$ ಗೆ ಗರಿಷ್ಟುಹಾಳಿ :

$$x_1 + 2x_2 \leq 10$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

(Turn over

12/2

(14)

(b) Solve the following transportation problem.

		To			Supply
		1	2	3	
From	1	2	7	4	5
	2	3	3	1	8
	3	5	4	7	7
	4	1	6	2	14
Demand		7	9	18	34

(15)

12/2

(ಬಿ) ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಗಣೀಕ ಸಮಸ್ಯೆ (Transportation Problem) ನೇ ಪರಿಪಾಠ ಕಾಡುಹಾಡಿಯಿರಿ :

		ಗೊಬ್ಬಾಳ್ಳಿ					ಸರಬರಾಜು	
		1	2	3	4	5		
ಸಾಗಣೀಕ	1	2	7	4	5		ಸರಬರಾಜು	
	2	3	3	1	8			
		3	5	4	7	7		
		4	1	6	2	14		
ಬೇಡಿಕೆ		7	9	18	34			

